

多聚赖氨酸溶液(1×PLL,0.1mg/ml,RNase free)

产品简介:

多聚赖氨酸溶液英文名为 Poly-L-lysine Solution 简称 PLL, Leagene Poly-L-lysine 为 Poly-L-lysine hydrobromide, 分子式为 L-Lys-(L-Lys)_n-L-Lys·xHBr, 分子量为 150,000~300,000, CAS Number 25988-63-0.

PLL 是一种粘附剂, 常用于载玻片的包被, 可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验, 分子量大于 70,000 的多聚赖氨酸可以促进细胞贴壁生长, 该试剂经 RNase free 处理, 可以用于促进细胞的贴壁生长和核酸杂交, 制备好的载玻片可 4°C 保存半年。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
Poly-L-lysine Solution(1×PLL,0.1mg/ml,RNase free)	IH0097	50ml
使用说明书		-20°C 避光
		1 份

操作步骤(仅供参考):

1、用于细胞培养

①根据实验需要 Poly-L-lysine Solution 稀释至适当浓度溶液后即可使用; 不同的细胞, Poly-L-lysine Solution 包被(Coating)的时间和浓度, 甚至稀释液的选择有所不同, 请自行参考相关文献进行适当的包被。

②Poly-L-lysine Solution 用于细胞培养时, 包被至少 5min, 有些实验需要包被 1~2h, 有些情况则需要包被过夜。

③包被完成后, 吸 Poly-L-lysine Solution, 自然干燥培养器皿, 至肉眼观察完全干燥; 通风橱内吹风数分钟即可完成干燥, 对于有些实验则需要干燥 2h 或更长时间; 干燥时间较长通常会更加有利于后续的细胞粘附。

④进行细胞培养, 也可以用水、PBS 或培养液等适当溶液润洗后再进行细胞培养。

2、用于核酸杂交

①方法一: 取事先准备好的载玻片或盖玻片经 160°C 冷却至室温, 在 Poly-L-lysine Solution 上下浸蘸几下, 自然干燥, 4°C 备用, 亦可室温保存 1 个月。

②方法二: Poly-L-lysine Solution 涂于玻片上, 自然干燥后即可使用, 可用于细胞涂片和切片。

③方法三: 滴加 5~10µl Poly-L-lysine Solution 至玻片上, 用另一盖玻片以血涂片方法推

片或用另一玻片紧贴于其上，相互摩擦以使两玻片相对的一面涂布上明胶包被溶液。

注意事项：

- 1、 Poly-L-lysine 可以被某些细胞所消化并吸收，摄入过多的 Poly-L-lysine 会产生一定的细胞毒性。
- 2、 避免反复冻融，如果大量使用，可以取适量溶液置于 4℃ 保存，6 个月有效。
- 3、 浸蘸 Poly-L-lysine Solution 时，务必使玻片完全浸入液体中，否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
- 4、 干燥过程中注意避免尘埃污染。
- 5、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 6、 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期： 12 个月有效。低温运输，-20℃ 保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
IH0305	柠檬酸钠抗原修复液(50×)
IH0340	免疫染色一抗稀释液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)