

## Western blot 二抗稀释液

### 产品简介:

Western blot 二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可用于免疫印迹中的二抗的稀释和配制, 经 Leagene Western blot 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1~2 周内重复使用 3~4 次。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PW0041	PW0041	Storage
	Secondary Antibody Dilution Buffer		50ml	100ml
使用说明书		1 份		

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据所用二抗的使用说明以及二抗的效价和目的蛋白的含量, 按照适当比例(如 1:1000、1:500 等比例)稀释二抗。
- 2、二抗稀释后即可直接用于孵育抗体, 一次 Western 结束后, 可以回收稀释的二抗, 4°C 保存, 用于下次的 Western, 通常在 1~2 周内可以重复使用 3~4 次。

### 注意事项:

- 1、为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C 条件下进行二抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓二抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PT0013	考马斯亮蓝快速染色液
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)